

## Il calendario vaccinale

Età	Vaccino
3° mese	Esavalente - Pneumococco - Meningococco B I dose
4°-5° mese	Esavalente - Pneumococco - Meningococco B II dose
7° mese	Meningococco B III dose
11° mese	Esavalente - Pneumococco III dose
13°-15° mese	MPR - Meningococco C
17° mese	Varicella - Meningococco B IV dose
5-6 anni	MPR - Varicella* - Richiamo di Polio e DTP

\*a partire dai nati nel 2014

### Legenda:

- **Esavalente:** vaccino a 6 componenti, contro le seguenti malattie: difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B ed emofilo.
- **MPR:** vaccino a 3 componenti, contro le seguenti malattie: morbillo, parotite e rosolia.
- **DTP:** vaccino a 3 componenti, contro le seguenti malattie: difterite, tetano e pertosse.

## Per saperne di più

Rivolgersi ai medici o agli assistenti sanitari dei Servizi vaccinali dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (vedi recapiti sul retro) o al pediatra di fiducia

Visitare i siti:  
[www.ministerosalute.it](http://www.ministerosalute.it)  
[www.vaccinarsi.org](http://www.vaccinarsi.org)

## A chi rivolgersi per maggiori informazioni

### DISTRETTO CENTRO NORD Trento

Centro per i servizi sanitari  
 viale Verona, pal. D  
 0461 902247

### DISTRETTO EST Pergine Valsugana

via San Pietro, 2  
 0461 515200  
 0461 515208

### Borgo Valsugana

viale Vicenza, 9  
 0461 755611

### Tonadico

via Roma, 1  
 0439 764424

### Cavalese

via Dossi, 17  
 0462 242183

### Pozza di Fassa

strada di Prè de Gejja, 4  
 0462 761000

### DISTRETTO OVEST

**Cles**  
 via Degasperì, 41  
 0463 660369

**Malè**  
 via 4 Novembre, 8  
 0463 909430

**Mezzolombardo**  
 via Manzoni, 1  
 0461 611293

**Cembra**  
 via Marconi, 7  
 0461 683711

### DISTRETTO CENTRO SUD

**Rovereto**  
 piazza Leoni, 11/A  
 0464 403706

**Arco**  
 largo A. A. d'Asburgo, 1  
 0464 582588

**Tione di Trento**  
 via Presanella, 16  
 0465 331428

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari © Copyright 2016  
 tutti i diritti riservati riproduzione consentita con citazione obbligatoria della fonte

Collana Promozione della salute  
 Azienda provinciale per i servizi sanitari  
 via Degasperì 79, 38123 Trento

Testi a cura: Unità operativa igiene e sanità pubblica - Dipartimento di prevenzione

Coordinamento editoriale: Servizio comunicazione interna ed esterna

Progetto grafico: OnLine Group - Roma

Finito di stampare nel mese di agosto 2016

[www.apss.tn.it](http://www.apss.tn.it)



## Le vaccinazioni del secondo anno di vita



Azienda Provinciale  
 per i Servizi Sanitari  
 Provincia Autonoma di Trento

## Cari genitori,

è importante proteggere il vostro bambino da morbillo, parotite, rosolia e dalla meningite da meningococco C e questo è possibile con la semplice somministrazione di due vaccini: MPR e antimeningococco C.

Morbillo, parotite e rosolia sono malattie altamente contagiose che possono dare gravi complicanze.

In particolare il morbillo può avere un decorso molto grave (encefalite).

Il meningococco C è causa di meningite, malattia che se pur poco frequente si presenta sempre in forma grave.

MPR e antimeningococco C sono vaccinazioni fortemente raccomandate a tutti i bambini dopo il compimento del 12° mese di vita.

## ■ Informazioni sulle malattie

### • Morbillo

Il morbillo è una malattia virale che provoca febbre elevata, tosse, esantema caratterizzato da macchioline puntiformi rosso vivo diffuse in tutto il corpo. Il morbillo può complicarsi con otite, polmonite, encefalite e diarrea.

### • Parotite

La parotite è una malattia virale che causa febbre, rigonfiamento delle ghiandole salivari parotidi, mal di testa. La parotite può portare a complicanze quali deficit dell'udito, meningite e danni ad altri organi (testicoli, pancreas).

### • Rosolia

La rosolia è una malattia virale che causa esantema, rigonfiamento delle ghiandole linfatiche nuchali e auricolari, febbre moderata. La rosolia contratta durante il primo trimestre di gravidanza può portare ad aborto nel 90% dei casi oppure a gravi malformazioni del nascituro quali sordità, cecità, difetti cardiaci, danni cerebrali.

### • Meningococco C

Il meningococco C è uno dei batteri che più frequentemente causano la meningite, un'inflammatione delle membrane che rivestono il cervello e che si manifesta con febbre, vomito, forte mal di testa e rigidità della nuca. La meningite è sempre una malattia grave, talora mortale, e anche nel caso di guarigione può lasciare degli esiti neurologici.

## ■ Vantaggi delle vaccinazioni

Le vaccinazioni del secondo anno di vita proteggono i bambini da queste quattro malattie.

Inoltre con il vaccino MPR si interrompe la trasmissione di morbillo, parotite e rosolia fino ad ottenere la loro eliminazione nelle scuole e nell'intera comunità.

## ■ Il vaccino MPR

La vaccinazione consiste in una iniezione sottocute utilizzando un unico vaccino trivalente (MPR). Il calendario delle vaccinazioni per l'infanzia prevede una prima dose tra il 13° e il 15° mese di età e una dose di rinforzo a 5-6 anni di età.

## ■ Il vaccino antimeningococco C

La vaccinazione consiste nella somministrazione di un'unica dose di vaccino per via intramuscolare.

## ■ Controindicazioni

In genere tutti i bambini possono essere vaccinati: le condizioni in cui le vaccinazioni non possono essere eseguite sono molto rare.

Il vaccino MPR è controindicato nei bambini che presentano le seguenti condizioni:

- malattie gravi o terapie (ad esempio cortisone ad alte dosi o la radioterapia) che causano un importante deficit del sistema immunitario;
- somministrazione recente di immunoglobuline (in quanto queste interferiscono con la risposta immunitaria al vaccino).

Prima di eseguire la vaccinazione il medico o l'assistente sanitario del centro vaccinale porrà alcune domande ai genitori per escludere l'esistenza delle rare condizioni di salute che controindicano o sconsigliano la vaccinazione (anamnesi pre-vaccinale). È bene riferire sempre su eventuali malattie, accertamenti sanitari o terapie in corso.

In caso di dubbi non esitate a chiedere spiegazioni.

Se il giorno della vaccinazione il bambino ha una malattia febbrile acuta in atto è bene spostare la vaccinazione a dopo la guarigione; i bambini con disturbi lievi, come raffreddore, un po' di tosse, qualche linea di febbre, possono essere tranquillamente vaccinati.

I bambini con allergia alle proteine dell'uovo possono essere vaccinati senza alcun pericolo.

Anche se la mamma aspetta un fratellino, il bambino può essere vaccinato tranquillamente.

## ■ Effetti indesiderati

La maggior parte dei bambini non manifesta alcun problema dopo la vaccinazione. Gli effetti collaterali più frequenti sono rappresentati da reazioni locali di breve durata nella sede dell'iniezione; alle volte può insorgere febbre e malessere generale; il vaccino MPR può dare febbre a distanza di 7-12 giorni dall'iniezione talvolta accompagnata da esantema transitorio, rigonfiamento

modesto e temporaneo delle ghiandole linfatiche del collo e della nuca.

Le reazioni gravi, seppur possibili, sono rarissime; va ricordato che i rischi legati alle vaccinazioni sono molto più bassi dei rischi derivanti dalle malattie verso cui esse proteggono.

## ■ Come controllare le più comuni reazioni al vaccino

In caso di reazione locale (dolore, gonfiore e arrossamento nella sede di iniezione) è possibile applicare un impacco freddo per diminuire l'inflammatione (se si usa il ghiaccio bisogna avvolgerlo in un panno di cotone per evitare il contatto diretto con la pelle).

Per controllare la febbre e il dolore è possibile somministrare un antipiretico ai dosaggi indicati.

Se queste reazioni persistono, nonostante gli accorgimenti consigliati, oppure se si manifestano reazioni più gravi, è opportuno rivolgersi al proprio medico.